

RABISIN 10FL 1D			
Tipo prodotto	FARMACO VETERINARIO		
Gruppo merceologico (G.M.P.) 8AA1 SPECIALITA MEDICINALI VETERINARIE			
Produttore	MERIAL ITALIA SpA		
Concessionario			
Prezzo	40,17 Euro		
Principio Attivo	VACCINO RABBICO INATTIVATO USO VETERINARIO		
Contenitore	SCATOLA	Forma farmac.	PREPARAZIONE INIETTABILE

MONOGRAFIA

DENOMINAZIONE

RABISIN

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Rabisin e' preparato attraverso la coltivazione del virus della rabbia su cellule di hamster, in seguito inattivato con betapropiolattone. Nell'allestimento di Rabisin sono stati perseguiti due obiettivi fondamentali per un vaccino antirabbico: innocuita' e attivita' elevata. L'innocuita' e' garantita dalla coltivazione del virus su colture di cellule embrionali di criceto (NIL) assolutamente prive di tessuto nervoso, da un'accurata filtrazione, prima dell'inattivazione, atta a eliminare ogni possibile contaminazione, dall'uso come inattivante del betapropiolattone che si idrolizza completamente senza lasciare alcun residuo tossico e in ultimo dal controllo dell'innocuita' mediante l'inoculazione intracerebrale di topi e il test di Mitchel su colture cellulari.

PRINCIPI ATTIVI

Ciascuna dose da 1 ml di vaccino contiene: Glicoproteine del virus della rabbia maggiore/uguale a 1 UI

ECCIPIENTI

Eccipienti q.b. a 1 ml.

INDICAZIONI

Indicazioni
Immunizzazione attiva di bovini, ovini, cani, gatti e cavalli sani contro la rabbia.

USO/VIA DI SOMMINISTRAZIONE

Sottocutanea, intramuscolare

POSOLOGIA

Posologia e modalita' d'uso

Bovini e ovini:

Vaccinazione di base

Soggetti di eta' inferiore a 9 mesi nati da madri vaccinate: 1 ml (1 dose)/capo eta' minima di vaccinazione 4 mesi

Vaccinazione di richiamo: tra i 9 e i 12 mesi di eta' poi richiami annuali

Soggetti di eta' inferiore a 9 mesi nati da madri non vaccinate: 1 ml (1 dose)/capo eta' minima di vaccinazione 2 mesi

Vaccinazione di richiamo: tra i 9 e i 12 mesi di eta' poi richiami annuali

uali

Soggetti di eta' superiore ai 9 mesi: 1 ml (1 dose)/capo eta' minima di
i vaccinazione 9 mesi

Vaccinazione di richiamo: annuale

Cani e gatti:

Vaccinazione di base: 1 ml (1 dose)/soggetto eta' minima di vaccinazio
ne 3 mesi

Vaccinazione di richiamo: annuale

Cavalli:

Vaccinazione di base

Soggetti di eta' inferiore a 6 mesi nati da madri vaccinate: 1 ml (1 d
ose)/capo eta' minima di vaccinazione 4 mesi

Vaccinazione di richiamo: un mese dopo la prima iniezione, poi richiam
i annuali

Soggetti di eta' inferiore a 6 mesi nati da madri non vaccinate: 1 ml
(1 dose)/capo eta' minima di vaccinazione 2 mesi

Vaccinazione di richiamo: un mese dopo la 1a iniezione, poi richiami a
nnuali

Soggetti di eta' superiore ai 6 mesi: 1 ml (1 dose)/capo eta' minima d
i vaccinazione 6 mesi

Vaccinazione di richiamo: annuale

CONSERVAZIONE

Conservazione

Conservare al riparo dalla luce, a una temperatura fra +2 e +8 gradi c
entigradi. Non congelare.

AVVERTENZE

Avvertenze

Vaccinare soltanto soggetti in perfetto stato di salute.

Rispettare le abituali condizioni d'asepsi.

Utilizzare per l'iniezione materiale sterile e privo di qualsiasi trac
cia di antisettico o di disinfettante.

SPECIE DI DESTINAZIONE

Bovini

Ovini

Cani

Gatti

Equini